

# 認識虎頭蜂

了解 · 預防 · 尊重生命 · 遠離危險

虎頭蜂屬於大型社會性昆蟲，具攻擊性，受到威脅時會群起攻擊，是台灣常見的危險蜂類之一。



## 虎頭蜂小檔案

學名：Vespa 屬  
體長：約2.5~5公分  
特徵：體型大、顏色鮮明  
危險性：受驚擾時會攻擊  
活動期：春末至秋季

## 常見虎頭蜂種類 (台灣常見)

### 1. 中華大虎頭蜂

*Vespa mandarinia*



- 體長：4~5公分
- 體色：頭部橘黃色、胸部黑色、腹部橘黃相間
- 特徵：體型最大，毒性最強，攻擊性高

### 2. 黃腰虎頭蜂

*Vespa affinis*



- 體長：3~4公分
- 體色：胸部黑色、腹部末端有明顯黃色帶
- 特徵：常見於低海拔山區，攻擊性中等

### 3. 黑腹虎頭蜂

*Vespa basalis*



- 體長：2.5~3公分
- 體色：全身黑褐色，腹部深色
- 特徵：體型較小，攻擊性較低

### 4. 黃腳虎頭蜂

*Vespa velutina*



- 體長：2.5~3.5公分
- 體色：腳部黃色，腹部末端黃色帶
- 特徵：外來種，對生態威脅大

※ 以上體長為工蜂大小，蜂后體型更大。

## 虎頭蜂的巢穴

多築於隱蔽處，形狀為球形或橢圓形，由紙漿狀材質構成。

### 樹上型



常見於樹林、高處樹枝間。

### 屋簷型



常築於屋簷、遮雨棚等處。

### 地下型



築於地下洞穴、土堆或草叢中。

! 發現蜂巢請勿靠近或自行摘除，應通報專業單位處理。

## 虎頭蜂的習性

- 活動時間** 白天活動為主，春末至秋季最活躍。
- 群居生活** 一巢數百至數千隻，階級分工明確。
- 食性** 肉食性，以昆蟲為主，也會取食樹液與成熟果實。
- 攻擊行為** 領域性強，巢穴受到威脅時會群起攻擊。
- 築巢地點** 多選擇隱蔽、乾燥、少人干擾的地方。

## 如何預防被虎頭蜂攻擊？



穿著長袖衣物、長褲，避免鮮艷顏色。



避免使用香水、髮膠等有香味的品。



避免靠近垃圾、果園、花叢等吸引蜂的地方。



發現虎頭蜂時，保持冷靜，慢慢離開現場。



切勿揮拍、丟石頭或驅趕，避免激怒蜂群。

## 遭遇攻擊時怎麼辦？

- 1 迅速離開現場**  
用最快的速度遠離蜂巢至少 20 公尺以上。
- 2 尋找掩蔽物**  
躲進室內或障礙物後，保護頭部。
- 3 受傷處理**  
被叮咬後儘速就醫，若出現過敏症狀（如呼吸困難、暈眩），立即撥打 119。



尊重自然、保護自己，遠離蜂巢，才能安心生活！



# 遇到虎頭蜂怎麼辦？

冷靜應對 · 遠離危險 · 保護自己

虎頭蜂具有強烈的領域性，當牠們覺得巢穴受到威脅時，可能會集體攻擊。遇到虎頭蜂時，請保持冷靜，正確應對，避免刺激牠們，確保自身安全。



## 遇到虎頭蜂時，請這樣做！

### 1. 保持冷靜



保持冷靜，不要驚慌奔跑或大聲尖叫，避免激怒虎頭蜂。

### 2. 緩慢離開



以緩慢、平穩的動作，往來時路徑的反方向離開。不要快速揮動身體或拍打。

### 3. 避開巢穴



儘量遠離虎頭蜂巢穴，至少保持 5 公尺以上距離，避免靠近或經過巢穴附近區域。

### 4. 遮蔽保護



經過易有蜂巢的區域時，建議穿著長袖、長褲、戴帽子，降低被叮咬的風險。

### 5. 尋求協助



若發現虎頭蜂巢或蜂群在附近活動，請通知相關單位處理，切勿自行摘除。

## 遇到虎頭蜂時，千萬不要這樣做！

### 1. 不要揮打



揮打會激怒虎頭蜂，引發攻擊。

### 2. 不要奔跑



奔跑會讓虎頭蜂更有威脅感，可能引來追擊。

### 3. 不要大聲尖叫



大聲尖叫或製造聲響，會刺激虎頭蜂的攻擊行為。

### 4. 不要靠近巢穴



靠近或試圖觀察蜂巢，容易遭到蜂群攻擊。

### 5. 不要自行摘除蜂巢



未經專業訓練與裝備，自行摘除非常危險！

## 不慎遭到虎頭蜂攻擊時

### 1 迅速離開現場

儘快離開危險區域，確保不再受到攻擊。



### 2 檢查傷口並處理

用清水與肥皂清洗叮咬處，可冰敷減輕腫痛。



### 3 觀察身體狀況

若出現呼吸困難、頭暈、噁心、全身紅疹等過敏反應，立即就醫。



### 4 儘速就醫

若被多隻叮咬或出現過敏症狀，請立即撥打 119 或儘速就醫。



### 可能出現的過敏反應

- 呼吸困難
- 胸悶、喘鳴
- 頭暈、虛弱
- 噁心、嘔吐
- 全身紅疹、發癢
- 心跳加速、血壓下降



出現以上症狀，請立即撥打 119！

## 虎頭蜂巢常見地點

- 樹木高處（樹枝、樹洞）
- 屋簷、遮雨棚、天花板
- 山區、郊外、草叢
- 電線桿、路燈、機電箱
- 廢棄建築物、空屋



## 發現蜂巢怎麼辦？

- 保持距離，勿靠近或騷擾
- 通知校園總務處、所在地區公所或 119
- 由專業單位處理，確保安全



尊重自然 · 遠離蜂巢 · 平安防蜂 · 保護自己與他人





# 虎頭蜂叮咬處理

冷靜處置 · 降低傷害 · 預防併發症



## 認識虎頭蜂叮咬

- 虎頭蜂毒性較強，叮咬處會劇烈疼痛、紅腫。
- 嚴重時可能引起過敏反應或休克，需提高警覺。

## 立即處理步驟

### 1 離開現場



迅速離開蜂巢附近，避免二次攻擊。

### 2 檢查並移除蜂針



用鑷子或卡片輕輕刮除，避免擠壓毒囊造成毒液注入更多。

### 3 清潔傷口



用肥皂和清水清洗叮咬處，減少感染風險。

### 4 冰敷消腫止痛



以毛巾包冰敷10~15分鐘，可減緩疼痛與腫脹。（每次間隔10~15分鐘）

### 5 觀察身體狀況



持續觀察是否出現過敏反應或不適症狀。

## 可能出現的症狀

### 局部症狀

- 劇烈疼痛
- 紅腫、灼熱感
- 發癢、麻刺感
- 局部硬塊或腫脹



### 全身症狀（過敏反應）

- 皮膚紅疹、蕁麻疹
- 頭暈、噁心、嘔吐
- 呼吸困難、胸悶
- 臉部或喉嚨腫脹
- 冒冷汗、意識不清



## ⚠️ 出現以下情況，請立即就醫或撥打119！



呼吸困難、喘不過氣



全身紅疹、蕁麻疹



頭暈、虛弱、意識不清



心跳加速、胸悶不適



**捷型** 曾被蜂類叮咬有嚴重過敏反應者，請隨身攜帶醫師開立之抗過敏藥物（如：EpiPen）。

**簡** 短時間內被多隻虎頭蜂叮咬，風險較高，務必儘速就醫。

**狀** 兒童、年長者或有心肺疾病者，被叮咬後更需密切觀察。

## 預防勝於治療



進入山區或野外穿著長袖衣物、戴帽子。



避免使用香水、髮膠等香味產品，也不要帶甜食、飲料暴露。



發現蜂巢，切勿靠近或挑釁，儘速遠離並通報相關單位。



保持環境整潔，妥善處理垃圾，避免吸引蜂類。



戶外活動結伴同行，遇蜂群攻擊互相協助。


遇蜂勿慌 · 冷靜處理 · 及早就醫 · 平安健康



# 遇蜂 5+1 字訣

問 · 樸 · 避 · 退 · 送 · 識

冷靜應對，遠離危險，保護自己與他人



## 1 問

先確認環境

先觀察周遭環境，確認是否有蜂巢或蜂群，評估風險再行動。



### 重點

- 抬頭看看、四處觀察
- 注意樹上、屋簷下、草叢、牆角等處
- 聽聲辨位，蜂群常有嗡嗡聲

## 2 樸

穿著樸素

穿著樸素上衣，灰白色等低調顏色，避免穿著過度鮮豔及使用香水。



### 重點

- 穿著樸素、長袖衣物為佳
- 避免紅、黃、橘等鮮豔顏色
- 避免使用香水、髮膠等
- 減少吸引蜂類的氣味與目標

## 3 避

避免靠近蜂巢

遠離蜂巢至少 5 公尺以上，不主動接近或挑釁蜂群。



### 重點

- 不靠近、不碰觸、不丟石頭
- 避免擅自摘除蜂巢
- 保持安全距離

## 4 退

緩慢後退離開

發現蜂群時，面對蜂巢緩慢後退，走原路離開，切勿轉身就跑。



### 重點

- 緩慢後退、面向蜂巢
- 離開蜂群活動範圍
- 不要繞行或靠近

## 5 送

通報專業處理

發現蜂巢或蜂群威脅公共安全，通報相關單位處理，交由專業人員處置。



### 重點

- 通報 119 或當地政府相關單位
- 提供確切地點與狀況
- 不要自行摘除或破壞蜂巢

## +1 識

認識蜂類知識

認識蜂類特性與季節習性，提升防蜂意識，預防蜂害發生。



### 重點

- 了解蜂類習性與活動季節
- 避免在危險地點逗留或活動
- 提升防蜂知識，保護自己與他人



尊重自然 · 遠離蜂巢 · 平安防蜂 · 保護自己與他人

